

FICHA TÉCNICA

PORCILIS® COLICLOS

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:

Cada dosis de 2 mL contiene:

E. coli: adh. fimbrial F4ab $\geq 9,3 \log^2$ título Ab*
 adh. fimbrial F4ac $\geq 6,5 \log^2$ título Ab*
 adh. fimbrial F5 $\geq 7,5 \log^2$ título Ab*
 adh. fimbrial F6 $\geq 7,4 \log^2$ título Ab*
 toxoide LT $\geq 10,5 \log^2$ título Ab*
 Antígeno *C. perfringens* tipo C ≥ 20 UI

Adyuvante
 Acetato de dl- α -tocoferil 150 mg

* Media del título de anticuerpo (Ab) obtenido después de la vacunación de ratones

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Viales de 20 y 50 ml para 10 y 25 dosis, respectivamente.

INDICACIONES:

Para la inmunización pasiva de la progenie por inmunización activa de cerdas multíparas y primerizas para reducir la mortalidad y signos clínicos durante los primeros días de vida, causados por esas cepas *E. coli*, que expresan las adhesinas F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99), F6 (987P) y/o producen LT y causadas el *C. perfringens* tipo C. Un efecto benéfico contra la infección causada por *C. perfringens* tipo A es observado bajo las condiciones de campo.

ESPECIES DESTINO:

Porcinos

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión para inyección.

DESCRIPCIÓN:

Vacuna contra la enterotoxosis neonatal por *E. coli* y enteritis por *Clostridium perfringens* C.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Inyección intramuscular en cerdas multíparas y primerizas de 1 dosis (2 ml) de la vacuna en el cuello en el área detrás del oído.

Esquema de vacunación:

- Vacunación básica: A las cerdas multíparas/primerizas que aún no han sido vacunadas con el producto se les administra una inyección primaria 6 a 8 semanas antes de la fecha esperada de parto y una inyección de refuerzo 4 semanas después.
- Revacunación: Se recomienda una revacunación única 2 a 4 semanas antes de la fecha de parto esperada.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

FOTO DEL PRODUCTO

1

PRECAUCIONES ESPECIALES:	
<i>Precauciones para su uso en animales:</i>	
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>	
Almacenar en refrigeración entre 2-8°C. Protéjase de la luz. NO CONGELAR.	
PERIODO DE RETIRO:	
No requiere (0 días)	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet International B.V. Países Bajos.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.