

FICHA TÉCNICA

PORCILIS® ERY+PARVO+LEPTO

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:

Cada dosis de 2 ml contiene:

Sustancias activas: cepas inactivadas de:

<i>E. rhusiopathiae</i> , serotipo 2 (cepa M2) PPD	≥ 1
Parvovirus Porcino (cepa 014)	≥ 65 U/ml ²
<i>L. interrogans</i> serogrupo <i>Canicola</i> serovar <i>Portland-Vere</i> (cepa Ca- 12-000)	≥ 1408 U/ml ²
<i>L. interrogans</i> serogrupo <i>Icterohaemorrhagiae</i> serovar <i>copenhageni</i> (cepa Ic – 02-001)	≥ 105 U/ml ²
<i>L. interrogans</i> serogrupo <i>Australis</i> serovar <i>Bratislava</i> (cepa como -05-073)	≥ 655 U/ml ²
<i>L. kirschneri</i> serogrupo <i>Grippotyphosa</i> , serovar <i>Dadas</i> (cepa Gr-01-005)	≥ 324 U/ml ²
<i>L. interrogans</i> serogrupo <i>Pomona</i> serovar <i>Pomona</i> (cepa P0-01-000)	≥ 83 U/ml ²
Serogrupo <i>L. santarosai</i> serovar <i>Tarassovi</i> , <i>Gatuni</i> (cepa S1148/02)	≥ 138 U/ml ²

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Caja de cartón con 1 frascos de 100 ml.
 Caja de cartón con 1 frasco de 250 ml.

INDICACIONES:

Para la inmunización activa de cerdos contra problemas reproductivos causados por parvovirus porcino y *L. Interrogans* serogrupo *Pomona* serovar *Pomona*.
 Para la reducción de los signos clínicos causados por *E. rhusiopathiae* y *L. interrogans* serogrupo *Canicola* y *L. interrogans* serogrupo *Pomona* serovar *Pomona*.
 Para reducir la infección causada por *L. interrogans* serogrupo *Canicola* serovar *Canicola*, *L. interrogans* serogrupo *Icterohaemorrhagiae* Serovar *Copenhageni* e *Icterohaermorrhagie L. Interrogans* serogrupo *Australis*. Serovar *Bratislava*, *L* serogrupo *Gryppotyphosa* y *Bananal/ Liangguang* y *L*, serogrupo *Tarassovi* serovar *Vughia* y *Tarassovi*
 Para reducir la excreción por *L.interrogans* serogrupo *Canicola* serovar *Canicola*.

ESPECIES DESTINO:

Porcinos

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable.

FOTO DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN:	
Vacuna Inactivada contra la Erisipela, Parvovirus y Leptospirosis en cerdos	
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:	
Administrar una sola dosis de 2 ml a los cerdos mediante inyección intramuscular	
CONTRAINDICACIONES:	
Este producto no debe utilizarse junto con productos que afecten la presión arterial o el funcionamiento cardíaco.	
PRECAUCIONES ESPECIALES:	
<i>Precauciones para su uso en animales:</i>	
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>	
Almacenar en refrigeración entre 2-8°C. Protéjase de la luz. NO CONGELAR.	
PERIODO DE RETIRO:	
No requiere (0 días)	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet International B.V. Países Bajos.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.