

FICHA TÉCNICA

PORCILIS® PCV

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:

Cada dosis de 2 ml contiene:
 Vacuna subunitaria de Circovirus Porcino Tipo 2 de proteína ORF2 (cápside) reproducida en baculovirus de línea celular de insecto (*Spodoptera frugiperda* Sf21-CB). $\geq 4.5 \log^2$ R.P.*

Acetato dl- α -tocoferol 25 mg
 Vehículo c.b.p. 2 ml

*R.P.= Potencia Relativa

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Frasco con 100 ml (50 dosis).
 Frasco con 200 ml (100 dosis).

INDICACIONES:

Para la inmunización activa de cerdos con el fin de reducir la carga viral y la excreción de Circovirus Porcino (PV) Tipo 2, asociadas con las enfermedades causadas por este virus.
 La utilización de la vacuna reduce la mortalidad y la pérdida de peso durante los periodos de destete y engorde.

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Cerdos (destete y engorde)

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable.

DESCRIPCIÓN:

Vacuna subunitaria inactivada contra Circovirus Porcino tipo 2

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 2 ml por vía intramuscular.

Programa de vacunación:

En caso de niveles bajos de anticuerpos maternos contra el PCV2 o cuando ocurren enfermedades asociadas con el PCV2 en animales de más edad, se recomienda una sola dosis de la vacuna.

Administrar una dosis de 2 ml, por vía intramuscular en el cuello, en el área detrás de la oreja a cerdos de 3 semanas de edad o más.

Cuando se espera que exista un mayor nivel de anticuerpos maternos contra el PCV2, se recomienda lo siguiente:

- 1ra dosis: Administrar 2 ml por vía intramuscular a partir de los 3-5 días de vida.

- 2da dosis: Administrar 2 ml por vía intramuscular 2 o 3 semanas después de la primera administración.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

Precauciones de Almacenamiento:

Almacenar en refrigeración entre 2-8°C.

Protégase de la luz. NO CONGELAR.

Una vez abierto el envase, utilice dentro de las 8 horas siguientes.

PERIODO DE RETIRO:	
No requiere (0 días)	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet International B.V. Países Bajos.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.