



## FICHA TÉCNICA

### REGUMATE PORCINO®

USO VETERINARIO

#### RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:

Fórmula:  
Cada ml contiene:  
Altrenogest 4 mg  
Excipiente, c.b.p. 1 ml

PRESENTACIÓN  
COMERCIAL:

Envase de 540 ml y de 1 litro.

INDICACIONES:

Cerdas:  
- Como sincronizador del estro en cerdas nulíparas que se encuentren ciclando.  
- Para incorporar cerdas después del destete a las pjaras.

Yeguas:  
- Para normalizar el estro durante el periodo de transición.  
- Para sincronizar el estro en yeguas cíclicas.  
- Para suprimir el estro en yeguas en competencia

FOTO DEL  
PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Porcinos y equinos

FORMA FARMACÉUTICA:

Solución oleosa al 0.4%

MECANISMO DE ACCIÓN:

Regulador del ciclo estral en el ganado porcino y equino, produce un efecto progestacional. Esto significa que actúa de modo similar a la progesterona, simulando la presencia de un cuerpo lúteo.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

Cerdas:

- Hembras nulíparas: Administrar 5 ml de Regumate por cerda diariamente, durante 18 días consecutivos.
- Hembras multíparas: Administrar 5 ml de Regumate por cerda diariamente durante 5 días consecutivos. Iniciar el tratamiento al momento del destete.



2

<p>Yeguas: La dosis a administrar es de 0.044 mg/kg, lo que equivale a la siguiente dosificación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Peso aproximado</th> <th>Regumate®</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350 kg</td> <td>4 ml</td> </tr> <tr> <td>450 kg</td> <td>5 ml</td> </tr> <tr> <td>500 kg</td> <td>5.5 ml</td> </tr> <tr> <td>550 kg</td> <td>6 ml</td> </tr> <tr> <td>600 kg</td> <td>7 ml</td> </tr> </tbody> </table>		Peso aproximado	Regumate®	350 kg	4 ml	450 kg	5 ml	500 kg	5.5 ml	550 kg	6 ml	600 kg	7 ml
Peso aproximado	Regumate®												
350 kg	4 ml												
450 kg	5 ml												
500 kg	5.5 ml												
550 kg	6 ml												
600 kg	7 ml												
<p><b>CONTRAINDICACIONES:</b></p> <p>No administrar Regumate® a yeguas que presenten o hayan presentado inflamación uterina (endometritis aguda, sub-aguda o crónica). La terapia con progestágenos puede exacerbar este problema.</p>													
<p><b>PRECAUCIONES ESPECIALES:</b></p> <p><i>Precauciones para su uso en animales:</i></p> <p>En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.</p>													
<p><i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i></p> <p>En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.</p>													
<p><i>Precauciones de Almacenamiento:</i></p> <p>- Consérvese en lugar fresco y seco a temperatura ambiente (no mayor a 50 °C) y protegido de la luz y el calor excesivo.</p>													
<p><b>PERÍODO DE RETIRO:</b></p> <p>Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 9 días después de finalizado el tratamiento.</p>													
<p><b>PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:</b></p> <p>Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.</p>													
<p>INFORMACIÓN ADICIONAL: <a href="https://www.msd-salud-animal.com.pa/">https://www.msd-salud-animal.com.pa/</a></p>													
<p>PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.</p>													
<p>CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.</p>													
<p>SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.</p>													
<p>MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.</p>													
<p>ELABORADO POR: Intervet Productions S.A. Francia</p>	<p>IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.</p>												