


1

FICHA TÉCNICA	
REVALOR® H USO VETERINARIO	
RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN	
FÓRMULA:	Acetato de trembolona200 mg 17 β estradiol20 mg Excipiente c.b.p. un implante con 10 comprimidos.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Estuche con 2 sachets conteniendo 1 cartucho con 10 implantes de 7 comprimidos o pellets cada uno.
INDICACIONES:	Implante promotor del crecimiento para bovinos hembra de engorde en corral. Aumenta la ganancia de peso. Mejora la conversión alimenticia. Reduce el tiempo de engorde.
ESPECIES DESTINO:	
Bovinos.	
FORMA FARMACÉUTICA:	
Pellets para implante	
MECANISMO DE ACCIÓN:	
Implante de liberación lenta y sostenida, que asegura su acción por un periodo hasta de 140 días, para finalizar bovinos hembra en corral	
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:	
<p>Novillas alimentadas en corral durante la etapa de finalización del engorde: un implante (7 pellets) se administra por vía subcutánea a cada animal.</p> <p>El implante se coloca debajo de la piel en la parte posterior del oído por medio de una pistola de implantes especial.</p> <p>Los siete pellets que conforman la dosis de REVALOR H se encuentran incluidos en una división del cartucho de múltiples dosis. Cada cartucho contiene diez dosis.</p> <p>El cartucho se diseñó para utilizarse con una pistola de implantes especial, y el implante se coloca debajo de la piel en la parte posterior del oído por medio de esta pistola especial de implantación.</p> <p>Posición en la que se debe sujetar la oreja del bovino al momento de la implantación.</p>	
 	
CONTRAINDICACIONES:	
No administrar en animales destinados a la reproducción.	

PRECAUCIONES ESPECIALES:	
<i>Precauciones para su uso en animales:</i>	
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>	
Almacénese por debajo de 25°C Protéjase de la luz.	
PERIODO DE RETIRO:	
En carne: 0 días La leche producida durante el tratamiento no debe darse al consumo humano.	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet International Bv Austria.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.