

FICHA TÉCNICA

UNIVAX® PLUS

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Cada dosis de vacuna viva contiene: Virus activo de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de Fabricio, cepa ST-12 $\geq 10^{2.3}$ TCID ₅₀ . Virus activo de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa de Fabricio, cepa 51-A $\geq 10^{2.9}$ TCID ₅₀ .
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Frascos x 2500 y 5000 dosis. Caja con 10 frascos para cada presentación.
INDICACIONES:	Para la vacunación de pollos sanos (Polla de reemplazo comercial, pollo de engorda y reproductoras) por vía oral en el agua de bebida a las 2 semanas de edad o mayores como una ayuda en la prevención de la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio.

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Aves de corral (Pollas de reemplazo comercial, pollos de engorde y reproductoras)

FORMA FARMACÉUTICA:

Vacuna Liofilizada para reconstituir.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Vacuna de virus activos de la Enfermedad de la Bolsa de Fabricio (IBF) contiene dos cepas virales intermedias (ST12 y 51A), desarrolladas en embriones de pollo y cultivos de tejido de pollo, se combinan con agentes estabilizadores. Los virus de esta vacuna han demostrado en estudios controlados que ofrecen protección contra los virus estándar y variante de la IBF.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Diluya la vacuna inmediatamente antes de usarla con agua limpia, fresca y sin cloro (o con leche en polvo o estabilizante si el agua es clorada). Vierta la vacuna rehidratada dentro de los siguientes volúmenes de agua y mezcle bien:

Cada 1 000 aves	Galones E.U.A.	Galones Imperiales	Litros Métricos
2 a 4 semanas de edad	2.5	2	10
4 a 8 semanas de edad	5	4	20
Más de 8 semanas de edad	10	8	40

Distribuya la vacuna diluida de manera que todas las aves puedan beber dentro del término de una hora.

CONTRAINDICACIONES:

No proporcione agua a las aves antes de la vacunación a fin de desarrollar sed en las mismas. La vacuna diluida deberá ser lo único que puedan beber hasta que ésta se haya consumido completamente. Evite la exposición del agua al sol. Lave y enjuague bien los bebederos para quitar todo residuo de desinfectantes.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
Precauciones de Almacenamiento:	
Almacenar en refrigeración entre 2-7°C. NO CONGELAR Protéjase de la luz.	
PERIODO DE RETIRO:	
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet Inc. USA	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.