

**MSD**

Animal Health

**FICHA TÉCNICA****KARSIVAN®
USO VETERINARIO****VASOTERAPÉUTICO**

FÓRMULA:	Cada comprimido contiene 3-metil 1 (5 oxohexil) – 7 – propil xantina (Propentofilina) 50 mg Excipiente c.s.p. 1 tableta (105 mg)
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Blíster con lámina de aluminio recubierto. Un paquete contiene 60 comprimidos recubiertos con película para aplicación oral.
INDICACIONES:	Karsivan® es un vasoterapéutico que mejora la circulación periférica y la oxigenación del cerebro, músculo cardiaco y esquelético, por lo que estimula el trabajo cardiaco, dilata los vasos sanguíneos, mejora las propiedades del fluido de los eritrocitos, mejora la capacidad de oxigenación e inhibe la agregación o acumulación de trombocitos.

**ESPECIES DESTINO:** Caninos**FORMA FARMACÉUTICA:** Comprimidos orales**DESCRIPCIÓN:**

La Propentofilina pertenece a los derivados de xantina que favorecen la vasodilatación central y periférica. Se ha demostrado que la propentofilina aumenta el flujo sanguíneo del cerebro, el corazón y los músculos. Inhibe la agregación plaquetaria y mejora las propiedades de flujo de los eritrocitos.

PROPIEDADES FARMACODINÁMICAS:

La Propentofilina pertenece a los derivados de xantina. En diversas investigaciones en especies animales se pudo demostrar que la propentofilina aumenta el flujo sanguíneo del cerebro, el corazón y el músculo esquelético. Inhibe la agregación de plaquetas y mejora las propiedades de flujo de los eritrocitos.

PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS:

Después de la aplicación oral de VIVITONIN® 50 es rápida y completamente absorbido y distribuido en los tejidos. Administrado por vía oral a perros los niveles plasmáticos máximos se alcanzaron a los 15 minutos. El tiempo medio es de unos 30 minutos y la biodisponibilidad de las cantidades de sustancia madre es aproximadamente 30%. Hay una serie de metabolitos eficaces y la biotransformación se lleva a cabo principalmente en el hígado. Propentofilina se excreta en forma de sus metabolitos en un 80 - 90% por vía renal. El resto se elimina en heces. No hay acumulación.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Se administra por vía oral. Puede administrarse directamente o escondido en un bocado o fragmentado y mezclado con el alimento.

La dosificación básica es de 3 a 5 mg/kg de peso corporal. Siempre que no se indique lo contrario, debe de administrarse dos veces al día, mínimo durante 30 días:

Perros con peso corporal de:	Número de comprimidos
2 – 4 kg	¼
5 – 8 kg	1/2
9 – 15 kg	1
16 – 25 kg	1 ½
26 – 33 kg	2
34 – 50 kg	3

1

**MSD**

Animal Health



2

CONTRAINDICACIONES:

No debe administrarse a perras gestantes o reproductoras ya que aún no se ha evaluado en esta clase de animales.

No usar en gatos.

REACCIONES ADVERSAS:

En algunos pocos casos puede provocar reacciones alérgicas (por ejemplo, urticaria). En estos casos es necesario suspender el tratamiento.

En caso de observar algún efecto adverso debido a la administración del medicamento, que no se mencione en este instructivo, favor de indicárselo al Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:***Precauciones para su uso en animales:***

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese en un lugar fresco y seco (a una temperatura no mayor a 25° C).

PERIODO DE RETIRO:

No aplica.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.

INFORMACIÓN ADICIONAL: <https://www.msd-salud-animal.com.pa/>

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

ELABORADO POR:

INTERVET GEMSBH.

Viena, Austria

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL

Bajo Licencia de Intervet International B.V.