

**MSD**

Animal Health

**FICHA TÉCNICA****NOBIVAC® PUPPY DP****USO VETERINARIO****VACUNA A VIRUS ACTIVO ATENUADO PARA LA PREVENCIÓN DEL DISTEMPER Y LA PARVOVIROSIS CANINA**

| | |
|--------------------------------|---|
| FÓRMULA: | Cada 1 mL (1 dosis) contiene: Virus de Distemper canino cepa Onderstepoort 10 ⁵ DICC Virus de Parvovirusis cepa clonada 154 10 ⁷ DICC |
| PRESENTACIÓN COMERCIAL: | Cajas de cartón con 10 viales de dosis única. Cajas de plástico transparente con 10 viales de dosis única. |
| INDICACIONES: | Para la inmunización activa con cachorros jóvenes contra el moquillo (distemper) canino (VMC) y la enfermedad por Parvovirus canino (PVC). |

**ESPECIES DESTINO:** Caninos**FORMA FARMACÉUTICA:** Polvo liofilizado con diluyente**DESCRIPCIÓN:**

Nobivac® Puppy DP contiene cepas activas atenuadas del virus del Distemper canino (moquillo, cepa Onderstepoort), y Parvovirus canino cepa 154 (CPV 154), reproducidas en cultivos de líneas celulares. Contiene estabilizadores y trazas de antibióticos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

El contenido de un vial de vacuna reconstituida deberá inyectarse por vía subcutánea.

Reconstituir inmediatamente antes de usar con la adición del contenido de un vial (1,0 ml) de **Nobivac Solvent** (diluyente).

La vacuna deberá utilizarse antes de los 30 minutos posteriores a su reconstitución.

Nobivac® Puppy DP está indicada para el uso en animales con niveles elevados de Anticuerpos Derivados de la Madre (MAD, por sus siglas en inglés) contra el virus del moquillo canino y parvovirus canino. La edad más temprana a la que estos niveles no interfieren con la vacunación es de 4-6 semanas en la mayoría de los animales. Para asegurar la protección de cachorros individuales que no responden a esta edad por niveles muy elevados de Anticuerpos Derivados de la Madre y proporcionar protección contra hepatitis (CAV1), infecciones por CAV2 y Parainfluenza, se aconseja continuar la vacunación con **Nobivac® DAPPvL2** o **NOBIVAC® DAPPvL2 + Cv** o **Nobivac® DAPPv+L4** a intervalos de 2 a 4 semanas, hasta que el cachorro cumpla las 12 semanas de edad (verificar disponibilidad de productos en cada país).

Si se utiliza **Nobivac® Puppy DP** a las 4 semanas de vida, se debe de repetir una 2da dosis a las 6 semanas de vida y posteriormente, continuar el calendario de vacunación con vacunas múltiples de la línea **Nobivac®** a los intervalos señalados en el párrafo anterior

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá realizarse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación.
- Utilice material estéril para la administración.
- Evite la contaminación de la vacuna con restos de desinfectantes o alcohol.
- La vacuna deberá utilizarse antes de los 30 minutos posteriores a su reconstitución.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

1



MSD

Animal Health



2

| | |
|---|--|
| REACCIONES ADVERSAS: | |
| Ocasionalmente pueden producirse reacciones de anafilaxia y/u otras reacciones inflamatorias de hipersensibilidad, igual que puede suceder con todas las proteínas extrañas. Epinefrina, corticosteroides, y antihistamínicos pueden ser indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción. | |
| ADVERTENCIAS: | |
| Vacune únicamente animales sanos. Después de la vacunación, deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta 14 días después de la inoculación. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. | |
| PRECAUCIONES ESPECIALES: | |
| Precauciones para su uso en animales: | |
| En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto. | |
| Gestación, lactancia y fertilidad: | |
| Se pueden vacunar hembras gestantes. La experiencia ha demostrado que el estado de los anticuerpos maternos de los cachorros de la camada varía y no deberá confiarse sólo en la exploración serológica de la hembra. | |
| Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antidotos): | |
| En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto. | |
| Precauciones de Almacenamiento: | |
| Almacene entre 2° y 8°C. NO CONGELE. | |
| PERIODO DE RETIRO: | |
| No aplica. | |
| PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO: | |
| Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos. | |
| INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/ | |
| PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE. | |
| CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. | |
| SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. | |
| MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. | |
| ELABORADO POR: Intervet International BV. Países Bajos. | IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V. |