

**MSD**

Animal Health

**FICHA TÉCNICA****NOBIVAC® DAPPV + L4****USO VETERINARIO****VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DEL MOQUILLO (DISTEMPER CANINO), ADENOVIRUS TIPO 1 y 2, PARAINFLUENZA, PARVOVIRUS Y LEPTOSPIROSIS CANINA****FÓRMULA:**

Cada dosis de 1 ml contiene:

*Fracción liofilizada (virus activos atenuados):*Virus del Moquillo canino (CDV), cepa distemperoid $\geq 10^{3.7}$ TCID₅₀Adenovirus Canino Tipo 2 (CAV-2), cepa ditchfield $\geq 10^{4.8}$ TCID₅₀Parainfluenza Canina (CPI), cepa CPI-PR $\geq 10^{4.3}$ TCID₅₀Parvovirus Canino (CPV), cepa SAH-CPV-2b $\geq 10^{5.3}$ FAID₅₀*Fracción líquida (inactivada)**Leptospira interrogans serovar:*Canicola, cepa LC-NY ≥ 80 hámster PD₈₀Icterohaemorrhagiae, cepa LI-11403J ≥ 80 hámster PD₈₀Pomona ≥ 80 hámster PD₈₀Gryppotyphosa ≥ 80 hámster PD₈₀**PRESENTACIÓN COMERCIAL:**

Caja con 25 unidades de frasco/vial con liofilizado por 1 dosis, acompañado por diluyente estéril.

INDICACIONES:

La vacuna **Nobivac® DAPPv** es una vacuna de virus activos atenuados que es recomendada para la vacunación de perros sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad causada por el virus del moquillo canino, adenovirus canino tipo 1 (hepatitis) y tipo 2, virus de la parainfluenza canina, y parvovirus canino.

Nobivac® L4 es recomendada para la vacunación de perros sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad y mortalidad causadas por *L. Canicola*, *L. Icterohaemorrhagiae*, *L. Pomona* y *L. Gryppotyphosa*; la prevención de leptospiuria (eliminación de *Leptospira* en orina) causada por *L. Canicola*, *L. Icterohaemorrhagiae*, y *L. Gryppotyphosa*; y como ayuda en la prevención de leptospiuria causada por *L. Pomona*.

**ESPECIES DESTINO:** Caninos**FORMA FARMACÉUTICA:** Polvo liofilizado y diluyente para reconstituir, suspensión inyectable**DESCRIPCIÓN:****Nobivac® DAPPv+L4** es la combinación de una vacuna viva modificada liofilizada (**Nobivac® DAPPv**) y una bacterina inactivada líquida.**(Nobivac® L4)** utilizada como diluyente.**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**Agitar el vial de **Nobivac® Lepto4** y transferir su contenido al vial de **Nobivac® DAPPv** de forma aséptica. Mezclar suavemente hasta que esté disuelto.

Utilizar todo el contenido de inmediato después de la rehidratación.

Administrar una dosis (1 ml) por vía subcutánea.

1

**MSD**

Animal Health



2

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Vacunación básica:

La dosis inicial puede ser administrada a las 8 semanas de edad o más. Repetir en intervalos de 2 – 4 semanas hasta que el perro tenga 12 semanas de edad. Un mínimo de dos dosis es requerido para la inmunización primaria.

Revacunación:

Se recomienda la revacunación anual con una dosis.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá hacerse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación. Utilice material estéril para la administración. No esterilizado químicamente. Evitar la contaminación de la vacuna con restos de desinfectantes o alcohol.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

REACCIONES ADVERSAS:

En casos raros, una reacción de hipersensibilidad aguda transitoria (anafilaxis), fiebre, letargo, edema facial, vómito o diarrea puede ocurrir poco después de la vacunación. Antídoto: Epinefrina, corticosteroides, y antihistamínicos pueden estar indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

Los datos indican que el desarrollo de opacidad de la córnea no está asociado con el uso de este producto.

ADVERTENCIAS:

Vacune únicamente animales sanos.

Contiene gentamicina y anfotericina B como conservadores.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:***Precauciones para su uso en animales:***

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

No vacunar hembras gestantes.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

Precauciones de Almacenamiento:

Almacene entre 2° y 8°C.

NO CONGELAR.

PERIODO DE RETIRO:

No aplica.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.

INFORMACIÓN ADICIONAL: <https://www.msd-salud-animal.com.pa/>

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

ELABORADO POR:

**Intervet Inc.,
EE.UU.**

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL
Bajo Licencia de Intervet International B.V.**