

**MSD**

Animal Health

**FICHA TÉCNICA****NOBIVAC® INTRA-TRAC ORAL****USO VETERINARIO**

**VACUNA LIOFILIZADA PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA CAUSADA POR *Bordetella bronchiseptica*.**

**FÓRMULA:** Cada dosis contiene:  
*Bordetella bronchiseptica*, cepa B-C2  $\geq 1 \times 10^9$  UFC

Vehículo c.b.p. 1 dosis

**PRESENTACIÓN COMERCIAL:** Caja con 25 frascos de una dosis.

**INDICACIONES:** Para la vacunación de cachorros y perros adultos sanos como ayuda en la prevención de la traqueobronquitis infecciosa canina ("tos de las perreras") causada por *Bordetella bronchiseptica*.

**ESPECIES DESTINO:** Caninos domésticos

**FORMA FARMACÉUTICA:** Liofilizado y solvente en suspensión oral

**DESCRIPCIÓN:**

**Nobivac® Intra-Trac Oral Bb** es una vacuna para administración oral, contiene cultivo vivo avirulento de *Bordetella bronchiseptica*. La vacuna se presenta en forma liofilizada junto con diluyente estéril.

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Administrar 1 ml por vía oral.

**Preparación de la vacuna:**

Reconstituir asépticamente la vacuna deshidratada con el diluyente estéril proporcionado.

Retirar la aguja y administrar 1 ml por vía oral en la cavidad bucal.

Utilizar inmediatamente después de la rehidratación.

**PROGRAMA DE VACUNACIÓN:**

Vacunar cachorros sanos de 7 semanas de edad o mayores.

Se recomienda la revacunación anual.

**CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:**

- Sólo deberán vacunarse animales sanos y desparasitados.
- Utilizar agujas y jeringas nuevas, no esterilizadas químicamente.

**CONTRAINDICACIONES:**

No tiene.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Puede producir anafilaxis y/u otras reacciones inflamatorias de hipersensibilidad inmunomediadas. Administrar epinefrina, corticosteroides, y antihistamínicos pueden estar indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

**ADVERTENCIAS:**

Vacune únicamente animales sanos. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

**PRECAUCIONES ESPECIALES:****Precauciones para su uso en animales:**

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

**Gestación, lactancia y fertilidad:**

No se ha establecido la seguridad del producto durante la gestación.

**Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):**

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.



1



# MSD

Animal Health



2

**Precauciones de Almacenamiento:**

Conservar en refrigeración de 2°C a 8°C.

NO CONGELAR.

**PERIODO DE RETIRO:**

No aplica.

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:** <https://www.msd-salud-animal.com.pa/>

**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

**SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.**

ELABORADO POR:

**Intervet International, B.V.  
Países Bajos.**

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL  
Bajo Licencia de Intervet International B.V.**