

**MSD**

Animal Health

**FICHA TÉCNICA****NOBIVAC® RABIA / NOBIVAC® RABIES****USO VETERINARIO**

VACUNA INACTIVADA PARA LA PREVENCIÓN DE RABIA EN PERROS, GATOS Y HURONES

**FÓRMULA:****Componentes activos por dosis:**

Cultivo del virus de la rabia, clonado de la cepa Pasteur RIVM, cultivado en células BHK 21 clone CT

&gt;2.0 UI

Vehículo c.b.p.1 dosis **Conservador: tiomersal 0,01%****PRESENTACIÓN COMERCIAL:****Frascos de 1 o 10 (ml)/dosis****INDICACIONES:****Para la inmunización activa contra la rabia en perros, gatos y hurones en buen estado de salud.****ESPECIES DESTINO:** Caninos, felinos y hurones.**FORMA FARMACÉUTICA:** Suspensión acuosa inyectable.**DESCRIPCIÓN:****Nobivac® Rabia** es una vacuna en suspensión acuosa de fosfato de aluminio, que contiene virus de la rabia, clonado de la cepa Pasteur RIVM con una potencia  $\geq 2.0$  UI. El virus es cultivado en la línea de la célula BHK 21 clone CT e inactivado por Beta-propiolactona.**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Administrar 1 ml por inyección intramuscular o subcutánea.

**PROGRAMA DE VACUNACIÓN:**

	<b>Perros/Gatos</b>	<b>Hurones</b>
Primera vacunación a partir de	3 meses*	3 meses *
Revacunaciones cada	3 años*	1 año**
Vía de administración	I.M o S.C	S.C

\*Vacunar los animales a edad más temprana es posible; en este caso se necesita revacunación a los 3 ó 6 meses.

\*\*El intervalo recomendado entre las vacunaciones se ha basado en los resultados de los experimentos de desafío. Las regulaciones locales en vigor pueden requerir una revacunación más temprana.

Inmunidad: Transcurridas las 3 semanas después de la vacunación, se alcanzan los niveles máximos de anticuerpos, seguidos por un nivel constante suficientemente alto para dar protección.

**CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:**

•Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá realizarse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación.

•Utilice material estéril para la administración.

•Agite bien antes de usar.

**CONTRAINDICACIONES:**

Ninguna.



1



# MSD

## Animal Health



2

**REACCIONES ADVERSAS:**

Ocasionalmente puede producirse una reacción de hipersensibilidad generalizada. Epinefrina, corticosteroides, y antihistamínicos pueden ser indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción. En raras ocasiones, después de la administración por vía S.C., se puede observar un nódulo temporal en el sitio de inyección.

**ADVERTENCIAS:**

Vacune únicamente animales sanos.  
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

**PRECAUCIONES ESPECIALES:**

***Precauciones para su uso en animales:***

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

**Gestación, lactancia y fertilidad:**

Se pueden vacunar hembras gestantes.

***Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):***

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

***Precauciones de Almacenamiento:***

Almacene entre 2° y 8°C. NO CONGELE.

**PERIODO DE RETIRO:**

No aplica.

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:** <https://www.msd-salud-animal.com.pa/>

**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

**SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.**

ELABORADO POR:

Intervet International B.V., Países Bajos.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL

Bajo Licencia de Intervet International B.V.