

FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® DHPPi USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Cada dosis contiene: Virus vivo del Distemper canino, cepa Onderstepoort $\geq 10^{4.0}$ DICT ₅₀ Virus vivo del Adenovirus canino tipo 2, cepa Manhattan LPV3 $\geq 10^{4.0}$ DICT ₅₀ Virus vivo del Parvovirus canino, cepa 154 $\geq 10^{7.0}$ DICT ₅₀ Virus vivo de la Parainfluenza canina $\geq 10^{5.5}$ DICT ₅₀
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Caja con 10 frascos de una dosis.
INDICACIONES:	Para la inmunización activa de perros sanos contra el Distemper canino (moquillo), hepatitis contagiosa canina producida por el Adenovirus Canino Tipo 1 (CAV1), infecciones causadas por Adenovirus Canino Tipo 2 (CAV2), enfermedad de Parvovirus Canino (CPV) y el virus de la Parainfluenza Canina (CPI).


ESPECIES DESTINO:

Caninos

FORMA FARMACÉUTICA:

Vacuna viva liofilizada.

DESCRIPCIÓN:

Es una vacuna múltiple liofilizada contra Distemper Canino), Adenovirus Canino Tipo 2, Parvovirus Canino y virus de la Parainfluenza Canina.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 1 ml por vía subcutánea.

La edad preferida para la vacunación contra la hepatitis (CAV1) y la infección por CAV2 y la parainfluenza canina es a las 8 – 12 semanas de edad.

En la mayoría de los casos, esta edad es entre 6 y 9 semanas de vida, pero sería aconsejable realizar la vacunación final contra estas enfermedades a las 12 semanas de vida, con el objeto de asegurar la protección de los cachorros con niveles muy elevados de Anticuerpos Derivados de la Madre. Se incluyen las siguientes recomendaciones ya que es probable que la inmunización con Nobivac® DHPPi forme parte de las pautas de vacunación más amplia:

A. Pauta para cachorros con posible exposición a moquillo y/o parvovirus antes de las 8-9 semanas de vida y de los que se desconoce el estado de los Anticuerpos Maternos (MAD, por sus siglas en inglés):

4 – 6 semanas de vida Nobivac® Parvo C o Nobivac® Puppy DP.

8 -9 semanas de vida Nobivac® DHPPi con Nobivac® Lepto.

12 semanas de vida Nobivac® DHPPi con Nobivac® Lepto, Nobivac® Rabia o Nobivac® RL.

B. Pauta para cachorros en los que se inició la vacunación a las 8-9 semanas de vida.

8 – 9 semanas de vida Nobivac® DHPPi con Nobivac® Lepto.

12 semanas de vida Nobivac® DHPPi con Nobivac® Lepto, Nobivac® Rabia o Nobivac® RL

C. Pauta para cachorros en los que la vacunación no se inició antes de las 12 semanas de vida.

12 semanas de vida Nobivac® DHPPi con Nobivac® Lepto, Nobivac® Rabia o Nobivac® RL.

14 – 15 semanas de vida Nobivac® Lepto.

Revacunación: Nobivac® DHPPi ha demostrado desarrollar inmunidad durante un lapso mayor. Se recomienda que los perros se revacunen contra: 1. Distemper canino, hepatitis canina y parvovirus canino, hasta cada 3 años. 2. Infección por virus de la parainfluenza canina y leptospirosis, cada año. 3. Rabia, hasta cada 3 años (puede modificarse de acuerdo con la regulación local).

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

Precauciones de Almacenamiento:

Almacene entre 2° y 8°C.

NO CONGELE.

Protéjase de la luz.

Nobivac® Diluyente puede conservarse a temperatura ambiente.

Evitar la exposición prolongada o repetida a temperaturas ambientales elevadas una vez fuera del refrigerador antes de usar.

La potencia de la vacuna puede reducirse enormemente en el transcurso de algunas horas y en condiciones de mucho calor.

PERIODO DE RETIRO:

No aplica.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.

INFORMACIÓN ADICIONAL: <https://www.msd-salud-animal.com.pa/>

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

ELABORADO POR:

Intervet International BV.

Países Bajos.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL

Bajo Licencia de Intervet International B.V.