



FICHA TÉCNICA

NOBIVAC PARVO-C®

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:

La vacuna contiene cepas vivas, atenuadas, liofilizadas de parvovirus canino (cepa PVC 154) reproducidas en cultivos tisulares de líneas celulares. Se presenta en forma de gránulo liofilizado en viales de dosis única que contienen como mínimo 107,0, TCID₅₀ de PVC de virus de vacuna.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Cajas que contienen viales de Nobivac Parvo-C y viales de Nobivac Solvent o cajas que contienen sólo viales de Nobivac Parvo-C. Cada vial contiene una dosis única a reconstituir.

INDICACIONES:

Para la inmunización activa de cachorros jóvenes contra la enfermedad por parvovirus canino (PVC).

ESPECIES DESTINO:

Perros

FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada

DESCRIPCIÓN:

Nobivac Parvo-C está indicado para el uso en animales con niveles elevados de anticuerpos derivados de la madre contra parvovirus canino.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

El contenido de un vial de vacuna reconstituida debe de ser inyectado subcutáneamente. Reconstituya inmediatamente antes de sus uso mediante la adición del contenido de un vial (1.0 ml) de Nobivac Lepto o Nobivac L4 (vacunas contra la leptospirosis canina), o un vial (1.0 ml) de Nobivac diluyente. Después de su reconstitución, la vacuna debe de ser usada dentro de los siguientes 30 minutos.

CONTRAINDICACIONES:

Ocasionalmente puede producirse una reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica leve después de la vacunación, igual que puede suceder con todas las proteínas extrañas. Estas reacciones son autolimitadas en la mayoría de los casos.



PRECAUCIONES ESPECIALES:	
<i>Precauciones para su uso en animales:</i>	
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Precaución que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales: (Síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>	
En caso de intoxicación o sobredosis, llamar o acudir rápidamente a un centro hospitalario y mostrar empaque o etiqueta del producto.	
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>	
La vacuna deberá conservarse refrigerada (entre +2 y +8°C) y en la oscuridad. Deberá evitarse la exposición prolongada o repetida a temperaturas ambientales elevadas una vez sacada de la nevera antes de usar; la potencia de la vacuna puede reducirse enormemente en el transcurso de algunas horas y en condiciones de mucho calor. Nobivac Solvent puede conservarse a temperatura ambiente.	
PERIODO DE RETIRO:	
No aplica.	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: www.msd-salud-animal.com.pa	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet International B.V. Boxmeer, Holanda	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMÉRICA SA Bajo Licencia de Intervet International B.V.