

**MSD**

Animal Health



1

FICHA TÉCNICA**NOBIVAC® INTRA-TRAC ORAL****USO VETERINARIO****VACUNA LIOFILIZADA PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA CAUSADA POR *Bordetella bronchiseptica*.****FÓRMULA:** Cada dosis contiene:
Bordetella bronchiseptica, cepa B-C2 1 X 10⁹ UFC

Vehículo c.b.p. 1 dosis

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja con 25 frascos de una dosis.**INDICACIONES:** Para la vacunación de cachorros y perros adultos sanos como ayuda en la prevención de la traqueobronquitis infecciosa canina (“tos de las perreras”) causada por *Bordetella bronchiseptica*.**ESPECIES DESTINO:** Perros**FORMA FARMACÉUTICA:** Liofilizado y solvente en suspensión oral**DESCRIPCIÓN:****Nobivac® Intra-Trac Oral Bb** es una vacuna para administración oral, contiene cultivo vivo atenuado de *Bordetella bronchiseptica*. La vacuna se presenta en forma liofilizada junto con diluyente estéril.**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Administrar 1 ml por vía oral.

Preparación de la vacuna:

Reconstituir asépticamente la vacuna deshidratada con el diluyente estéril proporcionado.

Retirar la aguja y administrar 1 ml por vía oral en la cavidad bucal.

Utilizar inmediatamente después de la rehidratación.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Aplicar una sola dosis vía oral en cachorros sanos de 7 semanas de edad o mayores.

Se recomienda la revacunación anual.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Sólo deberán vacunarse animales sanos y desparasitados.
- Utilizar agujas y jeringas nuevas, no esterilizadas químicamente.

CONTRAINDICACIONES:

No tiene.

REACCIONES ADVERSAS:

Puede producir anafilaxis y/u otras reacciones inflamatorias de hipersensibilidad inmunomediadas. Administrar epinefrina, corticosteroides, y antihistamínicos pueden estar indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

ADVERTENCIAS:

Vacune únicamente animales sanos. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:**Precauciones para su uso en animales:**

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

No se ha establecido la seguridad del producto durante la gestación.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente a etiqueta del producto.





MSD

Animal Health



2

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar en refrigeración de 2°C a 8°C.

NO CONGELAR.

PERIODO DE RETIRO:

No aplica.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.

INFORMACIÓN ADICIONAL: <https://www.msd-salud-animal.com.pa/>

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

ELABORADO POR:

Intervet Inc.

EE.UU

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL

Bajo Licencia de Intervet International B.V.

En caso de eventos adversos o farmacovigilancia reportarlo a: farmacovet@merck.com
Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Intervet Central América S de RL. Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Torre MMG, Piso 15. Ciudad de Panamá.

www.msd-salud-animal.com.pa