

FICHA TÉCNICA

INNOVAX® ND-ILT USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Herpesvirus vivo del pavo cepa HVP/VENC/LTI* 4460 UFP** por dosis * HVP/VENC/LTI es un recombinante a base de HVP que codifica la proteína F del VENC y las glicoproteínas gI y gD del VLTl. ** Unidades formadoras de placa.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Ampollas de vidrio tipo I con un contenido de 1000, 2000, 3000, 4000 o 5000 dosis.
INDICACIONES:	Para la vacunación activa de embriones de pollo sanos de 18 días de vida por vía <i>in ovo</i> de pollos de un día de vida por vía subcutánea contra la enfermedad de Marek, enfermedad de Newcastle y laringotraqueítis infecciosa. Para la enfermedad de Marek se ha demostrado el inicio de la inmunidad a partir de los 5 días de vida. La duración de la inmunidad es de por vida. Para la enfermedad de Newcastle se ha demostrado el inicio de la inmunidad a partir de las 4 semanas de vida. La duración de la inmunidad es de por vida. Para la laringotraqueítis infecciosa, el inicio de la inmunidad se ha demostrado a partir de las 4 semanas de vida. La duración de la inmunidad es de por vida.

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Aves (embrión de pollo sano de 18 días de incubación, pollos de un día de edad)

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión celular congelada.

DESCRIPCIÓN:

La vacuna induce inmunidad activa contra la enfermedad de Marek, la enfermedad de Newcastle y la enfermedad de laringotraqueítis infecciosa y en pollos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Para la vacunación subcutánea se inyectan 0.2 mL en el cuello de cada pollo.
Para la vacunación *in-ovo* los huevos embrionados de 18 días de gestación se inyectan con una dosis de 0.05 mL por huevo.

La bolsa de la vacuna deberá agitarse suavemente varias veces durante el proceso de vacunación para garantizar que la suspensión permanezca homogénea y que se administre la cantidad correcta de vacuna (p. ej. durante largas sesiones de vacunación)

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.



Precauciones de Almacenamiento:	
Vacuna: Almacénese y transportese congelada en nitrógeno líquido (por debajo de los – 140°C).	
Contenedor: Almacene y asegure el contenedor de nitrógeno líquido en posición vertical en un cuarto limpio, seco y bien ventilado, separado de la sala de incubación para pollos.	
PERIODO DE RETIRO:	
21 días	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: INTERVET Inc. Estados Unidos	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.