



Lactotropina®
Union Agener, INC.

FICHA TÉCNICA Resumen de las Características del Producto

1. **Nombre de fantasía:** Lactotropina®
Nombre genérico: Somatotropina Bovina Zinc 500 mg
Forma Farmacéutica: Suspensión Inyectable.

2. **Composición:**

Cada jeringa contiene:
Somatotropina Bovina Zinc..... 500 mg
Excipientes csp.....1,4 mL

3. **Particularidades clínicas:**

a) **Especie(s) de destino:**

Bovinos de Leche.

b) **Indicaciones de uso, dosis, frecuencia, duración del tratamiento, vía(s) de administración y modo de empleo:**

- **Indicaciones de Uso:** Lactotropina® se utiliza para aumentar la producción de leche y eficiencia productiva en vacas lecheras sanas, en lactancia, y en adecuadas condiciones nutricionales.
- **Dosis, Frecuencia y Duración de Tratamiento:**
Dosis de Producto: 1 jeringa de Lactotropina® cada 14 días, comenzando la 9° semana después del parto, pudiendo extenderse su aplicación hasta 15 días antes del secado de la vaca.
- **Vía de Administración:**
Inyección Subcutánea.
- **Modo de Empleo:**
 - El sitio de inyección debe estar libre de suciedad.
 - Los sitios recomendados para su aplicación son: área del cuello, región pos-escapular (área detrás del hombro), depresión ubicada a ambos lados de la base de la cola.
 - En el caso que reciban dosis consecutivas se recomienda ir alternando el lado derecho e izquierdo del animal, para su aplicación.
 - Inyecte el contenido completo vía subcutánea.

c) **Período de resguardo:**

- Leche: 0 días.
- Carne: 0 días.

No se requiere eliminar la leche o dejar período de resguardo para el sacrificio del animal durante su uso.



Lactotropina®
Union Agener, INC.

d) Precauciones especiales para el operador:

- Evitar el contacto con la boca, piel y ropa.
- Lactotropina® es una proteína, por lo que su contacto frecuente con la piel puede ocasionar una reacción alérgica en ciertos individuos, por lo que se recomienda lavarse bien las manos y otras áreas de contacto con la piel, con abundante agua y jabón.

4. Particularidades farmacéuticas:

a) Periodo de eficacia: 48 meses.

b) Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerado: Entre 2 y 8°C. No congelar.

c) Descripción de los envases:

Cajas de cartón conteniendo 25 jeringas de polipropileno. Cada jeringa contiene 1,4 mL. Contiene inserto.

d) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:

No eliminar directamente al medio ambiente sino en contenedores especiales dispuestos para material corto punzante o para basura, según corresponda. En caso de producto no utilizado, se recomienda eliminar en plantas especializadas para destrucción de residuos.

5. Condición de Venta:

Bajo prescripción del médico veterinario.

Nombre y dirección del laboratorio fabricante:

Unión Agener, Inc.,
1788 Lovers Lane, Augusta
Georgia 30901
E.U.A.

USO VETERINARIO